庫全書

子部

病苦胃中如空状少氣不足少息四逆寒泄注不己名 夫右手關上脉陰陽俱虚者足太陰與陽明經俱虚也 欽定四庫全書 てこうえ しこう 口脾胃俱虚也 普濟方卷二十三 脾臟門 脾胃俱虚 明 周王朱棣 撰

金克匹库全書 泄痢腸胃俱滑或大病氣不復常飲食無味形容憔悴 塞反胃吐食心胸痞滿脇虚脹即腹剌痛牵引背膂食 千金大養脾丸出和 酒後多痰並宜服常服養脾壮氣多進飲食 少傷多言微氣短口苦舌滋惡心嘔喊喜睡嚥酸久病 肉豆熟 神麴 陳皮士麥蘇以尚香的 縮砂去 三稜处茯苓皮良薑 意次仁 白扁豆 治脾胃虚弱停寒留飲膈氣噎 丁香 益智

人とつ時という 參附大正氣散 治男子婦人虚弱及瘧安後體虚眼 昏暗加净枸杞子楝菊花蓝各半两常服順氣快牌 送下温酒亦可空心食前常服養益脾胃大進飲食 右等分為末煉蜜丸如彈子大每服一粒細嚼白湯 進美飲食 一方名補中養脾治證同前 藿香是山藥 附子 去皮臍人参去蘆 **岩梗炒人参** 普瀬方 木香水 是藿香葉 縮

當歸九 金万四月百十 空心服 音沉鼓痢風傷痛便痢無度 右為細末羅過每服二錢水一盞薑三片棗二枚煎 宿沉香人 厚朴 两 肉桂不見烏藥炒枳殼处炒青皮去黃香厚用鹽 砂仁 仁殿去丁香不見大陳皮去粉草多香附子必去 補脾安胃調氣止痛治脾虚寒腰重不舉語 檳榔 白术 白茯苓 益智仁 草 果

豿 (為末蜜九如桐子大酒服三十九加至四十九日 附子 白术各五

をいたるる 木香頓散 痢嘔吐膨脹 右吹咀每服三錢水一盞半薑三片棗二枚再以銀 器盛所煎藥於重湯內再煎至八分空心熱服 不煎凡和朝 白紅豆取草果仁 木香 私見縮砂仁 治脾胃虚弱停食不化心腹絞痛腸滑自 以及我们是是一种的一种,我们是一种的一种,我们就是一种的一种,我们就是一种的一种,我们们也是一种的一种,也是一种的一种,也是一种的一种,我们们们们们的一种,我们 治脾胃虚弱久有傷滞中脫氣痞心 卷二十: 甘草谷三白豆乾仁气青皮

次を日事を書 右件碾細莪术末入猪胰以膏同醋糊為丸如桐子 氣塊時發疼痛嘔噦酸水面黃肌瘦精神困倦四肢 思飲食或心腹刺痛氣刺氣急及療食微酒癖血瘕 腹膨脹脇下堅硬胷中痞塞噎氣不通嘔吐痰水 少力又治婦人血氣不調小腹污痛並皆治之 猪胰一京三稜 炒附子处去皮的砂五 帝 川楝子去山藥 Ų 蓬莪术 普消方 末各四兩已上二 一味令煮冷透切 檳榔 积殼表尚香 3 嗉

参苓壮脾丸一名大 補或病氣衰食不復常專受怯弱不能飲食及久病 情面色痿黄及中焦痞不任攻擊臟腑虚寒不受峻 滿心腹刺痛反胃吐食口苦吞酸胃滿短氣肢體怠 **オ鹽湯或温酒下** 候更量虚實加減常服順氣寬中消積滞化痰飲 大每服十五九生薑湯下婦人淡醋淡湯下不計時 泄痢肠胃虚滑並宜服之 老二十三 治脾胃虚弱骨膈飽悶脇肋脹

次で日本全日 阿膠丸 美飲食選す 不能剋化致脹滿腹疼嘔惡不食或利或秘悉主之 右等分為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼白湯 下温酒亦可空心食前常服有神養氣和脾補問進 畫 阿魏他 官桂人見遂术吃麥蘇炒神麵少青 治脾胃怯弱食肉食麵及食生果停滯中焦 胡椒 麥蘇 白ボ 茯苓是肉桂去粗皮縮砂仁去乾 普濟方 神麴 山藥 白扁豆 炒

参苓白木散油和 タクロノイディ 時薑湯送下麵傷用麵湯下生菓傷用麝香湯下 和不熱久服養氣安神醒脾悅色順正辟邪 中湍痞塞心忪氣喘嘔吐泄瀉及傷寒咳噫此藥中 右為末和勻用簿糊丸如菜豆大每服二十丸不拘 蓮肉生薏苡仁 縮砂仁 白蘿蔔子炒白木 百草霜黑巴豆去殼油 治脾胃虚弱飲食不進多困少力 枯梗 炒今年首白扁 三七筒乾薑

次で日本とき 思食調中九哥カ 肢體倦怠嘔吐惡心飲食減氣道不匀或吐痰水 石為細末每服二錢東湯調下小兒量嚴數加減 食前温米飲送下 石為細末蜜調白麵糊為九如桐子大每服三十九 陳麵以麥蘇以半夏麵 陳皮生烏藥多一 人参 4 三大香 二汁 浸去皮 一斤半 治脾胃久弱三焦不調胸服落悶 沉香 每五白术 五萬

補脾胃瀉陰人升陽湯 啟脾九百一 タラロア人 前服 膨脹腸鳴泄瀉不進飲食 右為末煉蜜丸如彈子大每服一九細嚼米飲下食 白紹砂仁 五銭 炒一 兩 白术 治脾胃虚弱氣不升降中滿痞塞心腹 厚朴 厚朴 土租皮 對 華華 地巴上十青皮湯洗神熱少麥蘇炒陳皮 表ニナニ 出海生 拔萃方 宿 一两廿草

次元日事主きる 淡渗之物及諸葉恐陽氣不能生旺也宜温食及薄 熱之物服助火邪而愈損元氣也亦忌冷水及寒涼 忌語話一二時辰計及酒濕麵大料物之類恐大濕 早飯後午飯前問口服藥前宜減食宜美食服藥記 右件吹咀每服稱三錢水二盞煎一盞去淖大温服 羌活的升麻公果胡一黄者一两人参七战甘草

當行之亦從權也得利勿再服此雖立食禁如無可 滋味以助陽氣大抵此法此藥欲今陽氣升浮耳若 知母先洗記火炒製加之若分兩則臨病斟酌不可 而用如見腎水旺及督任街脉三脉旺盛則用黃葉 渗泄淡味皆為滋陰之味為大忌也雖然亦有從權 食之物一切禁之則衛氣失所養矣亦當從權而食 久服恐陰氣盛為害也小便赤或溢當利之大便溢 之以滋胃也

次定の事とき 升陽益胃湯出濟生 時值秋燥今行濕熱少退體重節痛口乾古乾飲食 也當升陽益胃 洒浙惡寒淺涿不樂面色惡而不和乃陽氣不升故 無味大便不調小便頻數不嗜食食不消無見肺病 羌活或柴胡或獨活或防風五錢以其私旺人参 两炙甘草雨半夏味脉清者 宜用澤寫二錢不丁 者而黃連二桶皮四幾次於三銭小便不白芍樂五 苦凍力 脾胃虚之怠情嗜即四肢不收

氣也慎不可淡食以損藥力而助邪氣之降沉也可 滋味之食或美食助其藥力益升浮之氣而滋其胃 煎一蓋去潭温服早飯後午問服禁忌如前其樂再 利小便當少茯苓澤瀉若喜食初一二日不可飽食 恐胃再傷以藥力尚少胃氣不得轉運升發也須滿 加至五錢止服藥後如小便罷而病加增劇是不宜 右吹咀每服稱三錢生薑五片棗二枚去核水三盞 脾腎虚則肺最受病故因時而補易為力也 調和秋旺用人参白术芍藥之類及補肺為 次記の事といれる 黃者人参湯出海生 氣虚口不知味目中溜火而視物脱脱無所見小便 人乃陰陽氣血俱不足故或熱厥而陰虚或寒厥而 復傷若脾胃得安静尤住若胃氣稍强少食葉以助 天氣熱盛損傷元氣怠惰嗜即四肢不收精神不足 榖藥之力經云五穀為養五菓為助者此也 两脚痿軟遇早晚寒厥日高之後陽氣将旺後熱如 以小益形體使胃與藥得轉運升發慎勿太勞役使 普瀬方 脾胃虚必上焦之氣不足遇夏

中閉塞時顯嘔噦或有痰嗽口沃白沫舌强腰背脾 落庚申之不足 縮臍平故圍如繩東之急或則如刀刺腹難舒伸曾 汗尤甚若陰氣復在皮毛之上皆天熱之熱助本病 眼皆痛頭疼時作食不下或食入即飽全不思食自 頻數大便難而厥秘問院當心而痛兩脇下痛或急 也乃唐大腸辛肺金為熱所垂而作當光救元氣理 人参五 截炙甘草力白术力橘皮 卷二十三 大王コー ····· 如心龟悶加黄連二分或三分 如胃脘當心痛减 遠或空心服之忌酒食麵大料物類及過食冷物 胡二分或三分 右吹咀都作一服水二盞煎至一盞去滓稍熱服食 三分川芎三分 大寒藥加草豆鬼化五分 如脇下痛或縮急加柴 力升麻力麥門冬五少當歸二分黃蘇 酒洗 一錢炒麵分五味子的為大五分無汗或 如頭痛目中溜火加黃連二分或 如頭目不清利上壅下熱加蔓荆 苦済方

金岁四月在十二 血中伏火而不得潤加當歸身生地黃各五分桃仁 如大便澁滯隔一二日不見者致食少食不下血少 如氣短精神如夢寐之間精神無力加五味子九箇 生風其病人父頭風 加大黄煨五分不利者非血結秘而不通也是熟則 加之藥勿再服 子三分葉本二分細卒一分川芎三分生地黄三分 三枚湯洗去皮尖研今麻子仁泥五分如大便通所 如大便又不快利者勿用别藥小 老二十三 單血藥不可服加之當服黃

次至日本全書 不痛不惡寒者加芍藥五分黃芩二分却减五味子 **塾仁二分縮砂二分或三分與正藥同煎服** 太過或病心有憂滞鬱結之事更加木香二分白豆 分或二分并去白橘皮倍之去其邪氣此病本元氣 水四錢煎至一盞去滓空心服之其大便必大走也 者人参湯藥只用羌活五錢防風五錢二味吹咀以 不足惟當補元氣不當瀉之 如氣滯太甚或補藥 服便止 如胸中氣滯加青皮薄清香可愛者一

普游方

升陽除濕防風湯出海生 有りで見る言 諸藥同煎一大蓋去滓稍熱服空心食前 右咬咀除蒼木切作片子水一碗半煮至二大盞內 重數至圖而不能便或少白濃或少有血慎勿利之 便閉以升陽防風藥治之 以舉其陽則陰氣自除矣 蒼木 四两防風 的人成白花茶 自与藥 治脾胃久衰體重肢節疼痛大便塞小 板萃方 主治大便秘滞或裏急後

次王马事主書 益氣湯水革力 熱而不能經絡下咽不入肝經大黃苦寒重虛具問 氣短氣上怠惰嗜卧四肢不收六月中目疾作以散 作面目睛俱黄小便或黄或白大便不調飲食減少 肝散下數劑而行疾增劇予謂大黃牵牛雖能除濕 右㕮咀水四中盏煎至一盏去滓稍熱服之即愈 根截分五 獨活 治白樞判素有脾胃虚損證目痰時 柴胡 苦済方 升麻的風根截五甘草

比藥能走經除濕熱而不守本故不瀉本臟補肺與 此樂皆能守本而不走經者不滋經絡中邪守者能 脾胃本中氣之虚弱 **虚愈甚適當暑雨黃證增剔於脾胃肺中瀉外經中** 牵牛味辛能瀉氣重虚肺本嗽大作蓋標實不去本 之濕熱 橘皮一青皮一人参加甘草如一白木二白芍藥 防風小生華か為水水及冷小澤鴻二升麻小

炎之日日 日本日 製半夏天麻白木湯出流生 **喘稠粘湧出不止眼黑頭旋惡心煩悶氣短促上喘** 補職之元氣也 不利大便不通以藥利數行復添吐逆食不能停獲 滓稍熟空心服之 右件剉如麻豆大都作成一服水二盏煎至一盏去 此藥去時令浮熱濕蒸 五味子一麥門冬分人多分黃蘇分 普海方 治脾胃證時煩躁胷中

前此頭痛苦甚謂之足太陰痰厥頭痛非半夏不能 右㕮咀每服半两水二盏煎至一盏去滓大熟服 損復下两次則重虚其胃而痰厥頭痛作矣宜服此 無力不欲言心神顛倒目不敢開如在風露雲中 痛如惟身重如山四肢厥冷不得安卧蓋因胃氣已 次黃者亦澤寫五炒麵 天麻五人参五白木 老二十三 钱香术五桶皮 五半夏

人参与藥湯出海生 熱以滌中寒黃蘖大苦寒酒洗以主冬天少火在泉 發燥也 **麴消食荡育中滞氣大麥蘇麴東中助胃氣乾薬** 氣澤瀉於冷利小便導濕桶皮苦温益氣調中升陽 療眼黑頭旋非天麻不能除黃者甘温寫火補元氣 人參甘溫瀉火補中益氣二术甘苦温除濕補中益 人参》黄者或五味子首白芍藥一或當歸身三 治脾胃虚弱氣促憔悴

升陽湯一名黃耆 時泄瀉腹中鳴小便黃 右吹咀水一盏半煎一盏去滓稍熱服心 右吹咀分作二服每服水二大盞煎至一盞去滓稍 熟服食前 麥門冬 黄者二或甘草或升麻水果胡少橘皮心益智仁 分當歸身公紅花子 治一日大便三四次溏而不多有

益胃湯止濟生 欠いり 1011111111 升陽除濕湯此游生 怠惰燥熱氣短口不知味腸鳴大便微溏黃色身體 痛泄瀉無度小便黃四肢困弱並宜服之 右吹咀作一服水三蓋煎至一蓋去滓空腹服 智力半夏分生事二妻三箇同前至半服甘草少羌活分大麥蘇麵三分如胃寒澤寫三益 陳皮二升麻 柴胡 神麴 防風分五倉木 治頭問勞動則微痛不喜飲食四肢 善所方 治脾胃虚弱不思飲食腸鳴腹

生薑和中湯出海生 昏問口乾不喜飲食 参益胃湯 忌飲食失節生冷硬物酒食麵一方紅花少許名人 右改咀作一服水一大盞煎一盞去滓稍熱服食前 か升麻の白水が人参が半夏か益智仁か苦者二甘草が黄芩が當歸梢か養水 五分陳皮 柴胡小葉本外老活分升麻少蒼木或黃芩上 治食不下口乾虚渴四肢因倦

欠とりゅんこれら 養門方醫力 浙惡風灑灑惡寒唇口乾面目虚浮不思飲食 泄瀉或外感寒熱如瘧骨節煩疼並治之不得卧淅 稍熱服之食前 右吹咀水二盏生薑五片棗二枚擘開煎一盏去滓 藿香長厚朴 製半夏洗茯苓 每一人参少白术 纸 术为葛根五 酒黄芩少生甘草少炙甘草少橘皮少人参少白 治脾胃虚寒嘔逆惡心腹肋脹痛腸鳴

草豆鬼人出海生 致肺金大肠相輔而来尅心乗脾胃此大復其雠也 梅半箇前服之常服温門消痰下氣除寒疫 又大寒大燥二氣并垂之則苦惡風寒耳鳴及腰背 大勝心不復故皮毛血脉分內之間元氣已經於外 上焦元氣遇冬腎與膀胱~寒水旺時子能令母實 右吹咀每服四錢以水一盏生薑五片棗子二枚烏 甘草二分草果五附子此陳皮各三分 治脾胃虚而心火垂之不能滋染 巻ニ十三 大田の町といろ 作四肢厥逆身體沉重不能轉側頭不可以回顧小 便洩而時帰此樂主秋冬寒凉大後氣之樂也 聲鳴急附塞或日陽中城室中稍緩口吸寒風則復 亂心煩不安而為霍亂之漸騙咽不通噎塞極則有 痛及胃痛脇下急縮有時而痛腹不能弩大便多瀉 而少秋下氣不絕或腹鳴此脾問虚之極也智中氣 **睦不能開腹中微寒水反垂痰唾沃沫食入反出腸** 相引寫中而痛鼻息不通不聞香臭額寒腦痛目時 普済オ

妙大九一名椒 神趣四人參分畫黃四麥蘇麵一致五當歸身分就在沒洗去皮澤寫一分小便黃者分中夏一致五萬度人為一致五十夏一致五十八百種雖不生中草分熟甘草分青皮分益智仁分白種雖分生甘草分熟甘草分青皮分為是大人 凡如桐子大每服三五十九白湯送下斟酌加減 右為細末桃仁另研如泥一處研勻湯浸麵蒸餅 柴胡ニジュ 二分或四分詳 治脾氣久虚不進飲食停飲脇痛腹

欠こうえ こう 一神丸 治脾腎虚弱食不進泄瀉不止 南自服飲食倍進方用米飲下 器方 集 脹湍臟腑虚滑止而復痛痼冷傷寒久不愈 右為細未薄糊九如桐子大每服三五十九生薑湯 下食前空心服有飲加半夏麴二兩癸亥中予作數 破故紙四兩內豆熟二兩 白术西東華 官桂幸 吴茱萸炒川椒 善瀬方

時以酒下十日外飲噉如湯沃雪亦知此理也 右為細末用大肥聚為九四十枚生薑四兩切片同 飲食譬鼎釜之中置諸米穀下無火力雖終日米不 全作脾虚蓋腎氣怯衰弱真元衰为自是不能消化 補脾藥皆不效子受此方服之頻然能食此病不可 煮栗爛去薑取栗剥去皮核用肉研為膏入藥和杆 熟其何能化嘗記服兎絲子净淘酒浸曝乾日炒數 九如桐子大每服三十九鹽湯下有人進不得食服

金云四月全書

火七日日とこう 補脾散 又方以前方內加神麴麥蘇各一兩名四神九 又方以前方內加木香五錢茴香一兩名四神丸 **臌腑不利腹痛肠鸣** 右為末脾泄瀉訶子湯入鹽調下二錢脾虚腸鳴氣 不和瀉不止炒薑酒調下常服鹽湯點空心食前服 教竟夢原皮而一大香生五甘草五成 厚朴 治脾泄不止食積不消癥瘕塊結大腸滑泄 普濟才

和中九海 治脾胃怯弱陰陽不和三焦氣溢心腹 憔悴肢節煩疼常服中和順氣升降陰陽消痰止 店問 唱逆疾甚頭目不清因後少力飲食減少肌 右吹咀用水二鐘煎至七分去淖大温服下 黄書《人参》甘草五或白木或香木五陳皮 澤寫了猪苓以茯苓

八味理中九重力 焼胃九一名八味治脾胃虚冷疼痛泄瀉す見本門 頻 不 飲湯下 前煎生薑湯下方用生薑自然汁打糊為丸食後米 右為細末水煮麵糊為丸如桐子大每服五十九食 化 我白木 白茯苓去半夏湯洗生薑汁 治脾胃虚弱胸膈痞脹腹滿時痛 善游方 用巴豆二錢 胃虚冷水

身重四肢不舉嘔吐痰水腸鳴泄瀉飲食不化 潤入脾為快温補為宜若以荡滌寒邪祛逐冷積則 湯為健且免塞之殢即也 要樂緩急便得懂中常貯不可無之其九者得塞而 右為細末煉塞丸每服分作十九萬湯空心嚼下或 加半夏麵一两入鹽點服亦得名八味理中九養生 白茯苓各一甘草各一雨 白术四川董 縮砂仁 麥蘇西二人参 神熱

欠かり山口ところ 蘇橘丸 欲聞人聲忘誤喉痺補之 右攻咀以水一斗煮取三升分四服 黃連兩馬餘糧一白木 白皮八大聚七十 前欲嘔泄溶油下口乾四肢重好怒 乾薑為二大麻子而桑

治中湯出和 金河四月石書 大陰傷寒手足温自利不渴腹滿時痛咽乾其脉尺 通或大病瘥後胸中有寒時加咳嗽並宜服之又治 嘔逆霍亂吐瀉胸脾心痛逆氣短氣中湍虚膈塞不 右為細末煉蜜為九每兩分五九細嚼熱水下一丸 人参盖甘草少乾薑吃白木出青皮炒陳皮洗去 治脾胃不和飲食減少短氣虚贏而複

木香消穀九 院方 治脾胃俱虚不能消化水穀會膈 及病後心虚不勝穀氣或因病氣衰食不復常並宜 香減半名丁香温中湯 店問腸肠時脹連年累月食減嗜卧口苦無味**虚**羸 方若胃脫有寒痰浮於上嘔吐不已者半夏等分丁 右為細末每服三錢水一盞半煎至中盞去滓稍熱 少氣又治胸中有寒飲食不下翻胃惡心霍亂嘔吐 入鹽點服空心或霍亂氣未禁熱藥者尤宜服之一 +

加減思食九年華 治脾胃俱虚不消化水穀胸膈痞 悶腹脇時脹連年累月食減嗜卧口苦無味虛羸少 服之 氣又治胸中有寒飲食不下及胃翻心霍亂嘔吐及 右為細末水煮類糊為九如小豆大每服五十九加 至七十九米飲日進二服不拘時候 木香或青皮洗净陳皮洗净焙或桂去粗克薑丸 西華牛八两半 大かしかられるう 治脾胃虚熱 右為細末煉蜜為九如櫻桃大每服一丸細嚼白湯 下不拘時候如渴時含化一九生津液進飲食 病後心虚不勝穀氣或因病氣衰食不復常並宜服 為主棟甘草 二两五钱 神麴炒大麥蘇各五戲烏梅四東木瓜五錢白茯 猪皮 陳橘皮紅 生薑 人參 葱白

消食丸和劑 後心虚不勝穀氣或因病氣衰食不復常並宜服之 右為末蜜和為九如桐子大每服十五九加至二十 腹脇膨脹連年累月食減嗜卧口苦無味虛羸少力 右切擘之合陳米水煮如曇去橘皮空腹服? 又治胸中有寒飲食不下反胃翻心霍亂嘔吐及病 九米飲下日進二服不計時一方不用塞以蒸栗米 烏梅去放竟董 各四小麥菓三两神妙去雨二我 治脾胃俱虚不能消化水穀胸膈痞悶

四妙九湖九 欠につしたよう 選 作二次上為衣陰乾每服五七十九空心鹽湯下或右為細未酒糊丸如梧桐子大辰砂一分沉香一分 中夏作片水浸炒燥不用猪谷不用五味子與水清鹽以出煙為度不用鹽不用五味子與水清鹽以出煙為度不用鹽五味子則與水用故做 山藥一兩同炒豆裝一兩用鹽酒浸破故紙山藥一兩酒浸 於胸臆飲食既少復遲當以實脾土痰下氣順 治脾胃虚弱脾土不能化痰成窠斗停 普済オ 炒同 浸 大炒北

白术六乙湯此和 治脾胃不和心腹痞問肠肋旗脹 產香安門散出衛生 金罗四月石十四 口苦無味嘔城惡心不思飲食面色痿黃腸虚自痢 待腐熟 浑冷服食前 右為細末每服二錢水一蓋半薑三片煎至七分去養香 丁香 人參五分 陳皮五 米湯鹽酒湯下 治脾胃虚弱不進飲食嘔吐不

大かしり 101 人は、17 治脾胃氣虚食即汗出 華澄茄丸出海 如桐子大每服七十九食後淡生薑湯下 用華澄站不拘多少為細末薑汁煮神雞末糊為丸 或沸湯點服育神温胃逐濕消痰不以四時並宜服之 肌體瘦弱膈氣翻胃 右為細末每服二錢水一盞煎至八分空心食前服 白术去產甘草一两 治脾胃虚弱胸膈不快不進飲食

用山藥一味到如小豆大一半銀石器內炒熟一半 未食先嘔或聞食即吐不思飲思此乃脾胃虚弱 糊 生用為末米飲調下自獲其功 粥布絞取汁和眾手丸如梧桐子大空心米飲五十 九日五服又主脾胃氣冷吃食嘔逆下赤白痢如麵 用猪肝一筋薄片於瓦上曝令熟乾瘟篩為末煮白 治心腹虚膨手足厥冷或飲過苦溢涼劑晨朝

欠引到時代 厚朴湯出海生 腑虚滑 右吹咀每服四錢水一盏煎至七分温服不拘時 厚朴一两桶皮一两甘草炙乾薑西花苓一两 吴茱萸湯洗乾薑各二陳皮 木香皮肉桂 人参差當歸為一兩 治脾胃虚心腹滿及秋冬客寒犯胃 治脾胃虚寒氣不升降心腹刺痛臟 普瀬方 ++

白术散 治傷寒下後餘熱以藥下之太過胃中 金页四月在這 虚熟飲水無力也當生胃中津液多服此 之持扶胃氣以期平也 右粗散每服五錢水二盏生薑三片煎至一盏去滓 温服食前忌一切生冷之物戊火已衰不能運化又 加客寒聚為湍痛散以辛熟佐以苦平甘温以淡泄 人参 白木 木香 白茯苓 甘草 對灌香葉

たっこういっし 朴附丸 和中九 飲者多煎與之無時也如能食而渴白虎湯加人參 以服之一方用乾薑 石為末每服三錢至五錢水一盞煎至五分温服如 右為末蒸餅為凡如桐子大每服三五十九温水送 卜食前 橘紅 《人参或北木瓜或此生薑 《炙甘草 治脾胃久虚腸滑泄臍腹絞痛腸鳴洩瀉肢 治腹寒岩脾胃虚弱宜服補胃進食

金牙四月在言 體無力比藥補益 揀出東子外將其餘三味焙乾與後藥同為末 青州栗一百箇先將四味用水五升一處煮候水盡 服三十九早晚食前用陳米飲下 右七味為未將聚去皮核和藥為凡如梧桐子大每 厚朴五两去粗附子 人参而乾薑一两吃訶子一兩肉豆熟 治脾胃虚弱 现去皮臍, 剉大 进切片 49

2.17.21 右為極細末湯浸一宿蒸餅為九如梧桐子大每服仁而炒 後令出是膜碗香 藥入候不取合附 冷住仁香 黃龍畫四 每手鋪門夏炒 香機在子一 附二香工日 子三附 有疾 華操 一百子水源秤 横以慢餘新 切赫大次水 丁香 作不煮取洗泔 見候大浸水 五而赫赫入浸 胡 段计如二级秋 椒 慢乾糊十點 **火為即頭中** ÷ 縮砂 焙度用去水 乾取銀皮三

金云四月全書 十四文紙上有此藥方云江南土下人弱疾當作 乾尤妙如寒多加附子二两桂一两周馬即之祖承 有人在矣至晚各散出於塚外得幅紙裹太平錢八 奉因靖康初自泗州逃難山陽夜行墜古塚中已先 **脾外脾元壮實則欲啖美健自然無病壮脾有藥曰** 少入麵糊為九不妨更加淨陳皮二兩用鹽水浸焙 餅子稍冷用新布裹包裂去水方可用藥如攪難 法製薑附凡先祖甫弛擔即合此藥無日不服一生

類蘇湯出十便 治脾胃虚弱中院不健飲食進化 方可 湯點服不拘時此方妙處全在陳皮製令渾無藥味 右為細末乾淨以瓶威三五日今氣味調和才用沸 無病毒八十四祖母安人服之毒九十六母水國去 (服之壽九十八婆婦僕老皆飲食不減壯年甚妙 麥蘇一种類四半夏四甘草 茯苓二陳皮二生 董一題半斤

辟寒湯出十便 六君子湯出未集 右等分為末水七分蓋入冬瓜子少許同前 右為細末每服一錢沸湯點服不拘時候 胡椒纸 首香雨高良薑而丁香分甘草山两白鹽 人參 白术 治脾胃虚弱飲食減少易傷難化無 治脾胃弱嘔逆惡心腹脇脹痛 茯苓 甘草 半夏麴 治脾胃虚弱生風多困 送二十三 没石子

尺きうう ここう 水沃雪湯 作水治則愈 中煨冷鎔和薑末如桐子大每服三十粒空心米飲 右以白锡剉如櫻桃大以新水浴過入鐵銚子灰火 力肌瘦 良才便 |為細 四雨去皮 鲁 次 作 治脾胃虚腹脹減食甚者成水氣 楝 片 괖 子 附子末 ٠1٠ Ē. 四

甦脾散出衛生 更参散出衛生 金页四库全書 右為細末每服一錢鹽少許烏梅一箇沸湯點服 右以生薑自然汁煮糊為九如梧桐子大每服三五 十九陳皮湯下 好精梗知細類炒神趣一兩陳橘皮四兩人於而甘草四兩草果皮訶子 处槌取舶上尚香白术始縮砂長官桂人見良薑婦以上各二两 治脾胃虚弱冷食所傷胸膈不快 治脾胃虚弱冷氣作痛婦人心痛 卷二十三

火とついれ かいう 進食九出衛生 體三力精神疾为並宜服之 右件以前藥味碾為粗末入切生薑同再拌碾或杵 右為細末每服二錢鹽湯點服如加棗薑煎亦住 肉豆熟仁分厚朴五銭去 良薑海炒五味子一生薑二两去皮 去五 治脾胃久虚飲食減少腸滑或痢肢 散陳皮八 我去白术五甘草 普濟方 一两去皮切 登茄

草葉厚朴九出衛生 治脾胃虚弱全不思飲食腹痛 金与四月石書 成膏取出入塞器內淹一宿次日取出焙乾碾為細 董橘皮湯或米飲下早晚食前服之日進三服 末煮栗稠粥為九如梧桐子大每服三五十九煎生 滑洩腸胃怯薄關館不通此樂去濕厚腸胃固元臟 大進飲食充肌膚去酒毒 梅不去自草董也 草葉仁此今香熟去皮料細以蓋等分研細拌和海兩宿焙乾 陳二兩五錢去租皮洗切水煮數十沸眼乾東 卷二十三

欠ハラランショ 整脾九出衛生 減少服之補氣益脾元實臟腑長肌內駐顏色今百 右為細末水煮麵糊為丸如梧桐子大每服五六十 **九空心食前白湯下** 别為未白麵五錢青鹽四南木香一雨不 治脾氣虚四肢倦怠面色毒黄飲食 普済方

胃風湯 み下 如桐子大每服三四十九食前鹽湯温媛酒米飲任 **火上煎攪數次入白麵熬成膏和前件藥搗千下** 右件先将青鹽細研同陳橘皮末以水調作稀糊慢 益智肉一青皮 此粉草一茴香一两棟 益智南 雨青皮一两末 京三核 中 選我木 出術生 實鑑才 治脾胃久冷心腹脹滿腹痛腸鳴 雨

飲定日車全書 湯 厚朴温中湯出衛生 客寒犯胃時作痛 右為細末每服二錢水一盏 東子一筒煎七分温服 草五我附子一首士皮地製 神妙 教奏藥或甘五我油陳皮一西意於仁一两神妙 五麥藥五十五 我油陳皮一西意於仁一两神妙 五麥藥五十五 我油陳皮一西意於仁一两神妙 五麥藥五十 厚朴一兩陳皮一兩民甘草五萬華也發豆鬼 五錢油東是一兩一人 衛都管柱去皮川東紅寒煨河東勒三箇同檳榔二官桂五銭川東 而白术而人参此白茯苓班五味子而前了 普済方 治脾胃虚寒心腹脹湍及秋冬

白茯苓陳皮湯一名緩 治脾胃虚弱六脉俱終而指 戊火已衰不能運化又加客寒聚為湍痛散以辛熱仁或茯苓五或木香或 右為細未每服五錢水二盏薑三片煎至一盏去滓 之急小便不利大便不調精神短少此樂專治大渴 温服食前是一切生冷之物 佐以苦甘以淡泄之氣和胃和痛自止矣 下虚食少而渴不止心痞腹中或痛或深狭如繩束

飲之日車全書 題 右八件杆為細末煉蜜九如桐子大每服二十九食 不止腹中寀狭而食減少 右為末煉蜜為九如彈子大每服一九白湯空心下 胡椒一草澄茄一厚朴一雨乾薑儿 吴茱萸排淨三兩黑附子 五錢地官桂二車撥 如脉經腹中急甚加甘草三錢炙秋減薑一半) 出 未氏 酒洗焙 陳皮 治脾胃虚冷嘔逆酯心脹悶不快去 善酒方 乾薑 出海生 雨 ---

白豆鬼九出米氏 正牌散出十便 股虚浮状若水氣此藥主? 前温米飲下一日三服甚効 石等分為細末每服二錢煎燈心木瓜湯調下 白豆熟炒縮砂仁炒人多 香附子 治大病之後脾氣虚弱中湍腹脹四 補脾胃虚弱能則心問虚滿 茴香 陳橘皮 茯苓土

欠れついてんなり 大附子成鄉川當歸各一紅椒五白茯苓共烏雞煎丸 無無方 補脾胃虚弱 参大湯出蘭宝 湯調下 肢沉重 大每服五六十九空心鹽湯温酒化下 右為細末用烏鷄一隻米醋爛蒸合末為九如桐子 右為末煉蜜九如彈子大每服三十九食前人參畫 治脾胃虚弱元氣不能繁於心肺四 善酒方

益智和中凡 季秋合 金只匹库在書 右攻咀都作一服水二大盏煎法如常 黄耆《人参》及甘草《升麻 柴胡分三酒黄 益智仁一分黃者 分桶皮 致生地黄的黄黄,木香分 麹末 當歸身 : 総総砂仁か桂花 青皮分類末分為不或當歸 人参發五民甘草二分多門 乾生薑 紅花一成冬葉二分黃 橘皮各五草豆

兄っうう ここう 煮猪肚散 度入藥在內更以葱白| 莖鹽二錢同入猪肚內以 右件為細末每藥五錢用猪肚一枝去脂水洗三五 右為極細末湯 下細嚼亦可 花落酒 浸縮砂仁 附子 澄茄各一 皮臍竟畫原橘皮五廿草 暖脾胃治虚冷補臟進飲食生精血 . 浸蒸餅為丸每服二三十九温水 善清方 尚香炒肉豆熟 題東西 十^災肉桂 ニナベ · 皮 去 粗 肉

養合人噫氣生熱腫脹膨悶壮熟增寒頭疼如瘧也 氣弱冷氣垂之則不能腐化水穀而四肢身體無所專 則能推化水穀而無滯若飲食不節寒温失宜致脾胃 夫損其脾者調其飲食道其寒温臟腑充實脾胃和平 金兵匹库全書 食前 線擊定用淡漿水煮冷爛為度切作片子任意食? 脾胃虚冷水榖不化

碳石丸 火人了一个二十万一 積宜服 右除大黄京三稜并研藥外捣羅為末用醋三升飛 內豆卷 各一两青皮 碳石研範畫是蓬莪茂與猪牙皂角此對光花 我到丁香 詞黎勒皮 在桂去粗大黄温碎本京三稜鬼水的砂 研 治脾胃虚寒宿食不化攻脇痛磨氣塊取虚 普瀬方 多浸去里境白豆熟去檳榔 胡椒谷一巴豆一两五 ニナナ

在一只四人人人 丁香丸 治脾胃虚寒宿食不消 或七九生薑湯下量臟腑虚實加減婦人心痛醋湯下 藥用柳枝攪成膏硬輕得所候冷入臼搗一千杵為 半升又熬二十沸次入大黄末又熬五七沸下諸末 九三等或如菜豆大或如麻子或如黄米每服五九 沸叉入京三稜又熬五七沸次入白麵二兩無灰酒 硇砂於銀器內慢火熬三十沸次入巴豆又熬十數

次でのようといれる 或熱水下得微利住更量人虚實加減 醋一升化硇砂去滓入銀器中慢火煎之次下巴豆 右除硇砂大黄巴豆霜乳香沒藥外捣羅為末以鹽 霜匀两食久次下大黃末熬成膏拌諸藥更入醋煮 麵糊和擔一千杵如麻子大每服三九至五九温酒 英去皮青橘皮 過過去 巴豆霜先稱了光花雕沙淡藥研乾董 蓬莪茂州乳香 研京三稜州墨 猪牙皂

乳香煎丸 から四個人 銀器內職醋一升慢火熬成膏都入諸藥拌勾九 豆大每服十五丸臨卧温水下 想未光花五线醋青橘皮三分湯浸炒 乾添各一两五阿魏一分酯化到醋处添各一两五阿魏一分酯化 除捣羅外將乳香沒藥丹砂别研與揀實未同 乳香 治脾胃虚寒心腹痞滿宿食不消 丹砂 木香 沉香 为没 作餅炙揀實四腳 的 別 那 很毒

次記事を 五香丸 **与酒煮糊為丸如麻子大每服五丸至七丸熱水下** 餘十一味搖羅為末將丹砂巴豆與前三味通研 右先将安息香乳香硇砂三味細研用少酒浸良久 丹砂研內豆熟栽桂皮 白焙 檳榔山東澄茄各一附子五 粒去皮 治宿食不消腹脹膨悶 研出油 3 沉香 安息香 哲済オ 祖京三稜與當歸 乳香 三十九 硇砂 炝 焙块 製

華澄茄散出聖 ありにたる言 畫湯亦可 穀不消四肢無力 華澄茄級木香殿的豆兔五殿白木殿檳榔 豆魁 畫 五 戲桂心 三 枳 殼 藥搖羅為末每服三錢以水一蓋入生薑半分 去及河黎勒皮或內豆熟去数白茯苓五乾 治犀胃虚冷食即欲嘔心腹脹悶水 老二十二 夏村上 海州 美 祖皮 塗 裁 其 我 我 黄 去 掠 丁香 庭 陳 橘 皮 五錢麩炒

次至日年上十二 沉香煎丸 治飲食不消噫氣生熱面黃生熱腑臓 栗三枚煎至六分去滓食前熱服 調 右除沒藥外穗羅為末與研藥和勻煉塞丸如菜豆 皮房来與 唐各五錢炒 巴豆 皮心莫出油皮房 及 而 石硫黄 各一两别阿魏 超和作餅 死縮砂 上 百 石硫黄 各一两别阿魏 醋 浸去 砂石缩砂 植良 董 檳榔 熟土麵的 形點慢 人熬 乾 青橘 沉香 丁香 木香 胡椒 普渐方 沒藥 丹砂水别 飛研

青木香丸 治脾胃風勞冷氣 金万里上石一里 大用瓷盒町封每服二九食前臨即温生薑桶皮湯 下更量虚實大小加減 右為末煉蜜為凡如桐子大空心温酒下二十九 木香一两厚朴去粗皮生華人参 艺彩 皮麻 羌活去 蘆桂去粗白木 到熟地黄 西焙 到陳橘皮湯沒去吴茱萸各一两湯黃香 松競士 粮椰 附子

火をひ上したころ 温脾丸 魚 可加大黄二兩忌海藻菘菜猪肉冷水生葱生菜酢物 石捣篩蜜和九如桐子大空心飲服七九日三服亦 難奔 響腹滿喘氣虚之乾嘔不得食温中消穀療脾 法麴悉吴茱萸 治脾胃氣弱大腹冷則下痢小腹熱則小便 當歸 桔梗 茯苓 各三細辛 普油力 附子各二甘草 小麥與各五合枳實三秋桂心 乾薑 三两

金少四月百十二 人参崇胡湯 治脾胃不調宿食留滞腹脹發熱嘔逆 右粗篩每服四錢水一盞入生薑一片棗子一枚摩 酸水日漸羸瘦 破煎取七分去滓空心頓服日晚再服 黄耆各一两 柴胡女人参 白术 赤茯苓去黑桔梗炒陳橘 焙五味子 當歸始細辛 九去滑炒乾厚朴三两五錢去粗皮一兩湯洗七厚朴三兩五錢去粗皮 大黄各一两

たこううことこう 黃陸香丸 金液丸 食後米飲茶酒熱水任下 石為末醋煮麵糊為九如菜豆大每服七九至九 陳橘皮 京三稜 性 油 府 治脾胃虚寒宿食不消心腹刺痛不思飲 治脾胃虚宿食不消肠肋脹鴻胸膈不 普濟,方 **炙各二两五** 人 及 提 土 到 里福本巴豆 租皮 ৰেছি ヨナー 心膜 皮

每服一丸細嚼空心生薑湯或陳橘皮湯下 石셾研一十二味以安息香入蜜同煉丸鷄頭了 心腹刺痛不思飲食 皮五 香草葉飲選 两多丹砂研安息香各一 陸香研沉香 本本香 **1** 出百 巻ニナニ 治翻胃不進飲食 洒 皮去 粗白术 皮去

於是日華在書 大厚朴丸 不拘時 右攻阻每服四錢水一蓋半薑五片東一箇前七分 幾

に 錢及縮砂仁 黃者去遊 善計多無 白木西 陳麴炒陳橘皮分去相皮用生白木各一陳麴炒陳橘皮各 薑汁 炙魚 檀香各五甘草 治脾胃虚冷食即脹滿水穀不化 厚村畫製一店 草豆熟皮檳榔谷 普濟方 .削去租皮 沉香 当木香 10 + 1

寫痢水穀不化肢體倦怠不思飲食 不消心腹刺痛肠助膨脹嘔吐痰逆噫氣吞酸腸鳴 空心食前服 右為末煉塞凡如櫻桃大每服一凡細嚼桶皮湯下 藿香 河子处取白茯苓各一两白木 青州東 厚朴善計製配畫此半夏法清甘草 兩陳皮八兩去白已上六味用草豆乾去人参 治脾胃不和中脫氣滞宿寒留飲停

次門日本言 丁香煮散出百一 服食前 逆惡心不渴上虚飲食不下肢體瘦怠自汗不止陽 飲停痰氣積不散心腹大痛脇肋膨脹泄痢水穀嘔 氣暴脫及翻吐咳嗽中滿臟腑虚滑久新沉寒痼冷 右粗末每服二錢水一盞生薑三片煎六分去滓温 益智仁法良事处去红豆 了香不見川畫地甘草或附子一作川為陳皮 去白 治脾胃傷中脫痞滞胃口宿寒留 青皮各一 人去白 時打

温脾丸 金牙四月五十 右梅篩塞和凡如桐子大每服十五九三日増至二 **煎七分去滓帶熱空心食前服滓再煎病退即止** 方無紅豆 十九亦可食已服無當歸者用芎藭一兩代之忌猪 右為細木每服三錢水一盞半生薑三片入鹽少許 大黃一麥蘇其屯董馬一厚朴多附子吃當歸 治宿寒脾胃中冷心腹脹湍食不消化 人参 卷二十三

大きコーという 煨薑丸 腹疰問腹脹刺痛積滞寒飲膈氣酒病惡心虚煩不 右件為細末好酒煮稀糊為九小彈子大每兩作十 肉冷水海藻菘菜生葱等物 入粥食 如更加雞舌香並各等 華澄茄 青皮山陳皮山沉香 分用雞舌香即母丁香)出神 葉 附子处垂面砂者 桂去粗皮船上尚香 治脾胃虚冷飲食不消嘔喊氣逆心 普濟方 丁香錢 檳榔 四十五

金罗巴尼西言 香散意力 內以濕紙裏於慢大煨今紙焦為度取出和薑細嚼 **痿黄四肢無力或時吐逆** 温酒或鹽湯下空心食前服 六九用生薑一塊切作兩處各剜取成坑子安藥在 柴胡三分陳橘皮三分湯洗乾木瓜一厚朴二 丁香或人参 蘆頭 甘草山分泉半夏五銭湯 今香熟白豆熟去皮部黎勒 治脾胃氣虚積有冷氣食不消化面色 一兩恩高良董

欠いこつられたう 温中良事九出在 惡心中滿短氣噎聞食臭及療留飲腸鳴濕瀉冷瀉 不通食即轍吐咽膈噎悶兩脇疠刺嘔逆喉吐噫醋 注下不止常服健脾胃美飲食辟寒邪養正氣 冷油腻濕麵飴糖 半分棗三杖煎至六分去滓稍熱服不計時候忌生 右件桑搗粗羅為末每服三錢以水一中 蓋入生薑 S S 去皮臍 雨炝 温脾胃順三焦治寒痰聚結氣壅 四十六

勝金九出王氏 食及治一切氣不和女人血氣腫 嚼生薑桶皮湯米飲亦可空心食前 右為細末煉蜜為九每兩作一十二九每服一九細 炒焦甘遂少大戟 畫四斤乾薑此白水四两 肉桂三十 治脾胃虚寒宿食不消化積滞消酒 達我成場京三樣

董合九出和 次之日本とい 砂并膽帶煮麵糊為九如或豆大每服三九茶酒任 右除硇砂膽礬外用好酒一升生薑半斤鴵碎同浸 不化結聚成形心腹膨脹刺利成陣上連胸脇或脾 下婦人心氣痛醋湯下水氣及氣腫并痢疾生薑酒 宿取出去生薑將十味控乾焙塩為末以醋化兩 一切氣不和生薑湯下 研膽對各 治男子婦人虚氣血弱久積陰冷留滞 分研 普濟方 四十七

はいばんる言 胃久虚內傷冷物泄瀉不止腹痛腸鳴或久痢純白 服之永遠除根 **石為細末薑汁煮麵糊為凡每一兩作二十九人母服 小通不思飲食身體沉重面色矮黃或久患心 脾痛** 炮乾薑儿兩面砂 下青白肠滑不禁又治胃脘停痰嘔吐吞酸痞塞 香水見木香水見人参雨 厚朴去粗皮附子二两五錢的豆熟 卷二十: 研 八銭 白术 焙青皮

壮脾九出醫方 肢無力吐逆食不消或手足浮腫纖腑溏泄 內有傷積服之無不神効此藥不損臟腑 內用濕紙裹慢火煨一頓飯久取出去紙和薑細嚼 白湯送下孕婦不得服小兒一粒分四服老人小兒 **發指肚一枚淨洗用造酒大麴四** 酒煮爛取大麴茴香 C P C 規如拇指頭大切開作合子安藥於 治脾胃虚寒飲食不進心腹脹滿四 普濟月 練 兩 縫 同 定剉 厚 91. 朴 用 葱

金分四月百十 右為極細末用猪肚科和千百九如梧桐子大每服 飲食四肢無力 妙褐紅 肉豆熟 馬餘糧城砌縮砂仁 錢 九用米飲下不拘時候 恵す 业聖 两去 附子皮臍白木 治脾胃虚冷食不消化腹脇氣脹不 卷二十: 黄白术分附子 木香水見丁香 思

次足の事とき 白术散出聖 寒極四肢逆冷 煎至六分去滓不計時候稍熱服 右件樂搗篩為散每服三錢以水一中盞入東三枚 白术而吴菜萸 没去白焙 治脾胃虚冷水穀不化腹脇脹湍或 微少厚朴 更五 数甘草 通焙乾微炒到黎勒 普流方 也 好真 且 起一 雨 一兩煨

和胃丸 金グピルカーで 前以粥飲下三十九是生冷油膩濕麵 **右件樂捣羅為細未煉塞搗勻為凡如梧桐子大食** 榔 Ъ 剉錢 頭 桔梗五錢去桂心三附子 治脾胃虚冷食即嘔逆水穀不化或時泄 生薑汁矣透草薑吃當歸各一兩四两去粗皮乾薑吃當歸各一兩 炮 細辛 五華松西甘草 湯洗去 炙剉 分微去 皮 ৰ্ম্য 麻炬 各二 雨 次

次至日華在上 大温脾丸家藏方 嘔逆吞酸不思飲食 十九温生薑棗湯下米飲亦可不拘時 右為細末酒麵為九如梧桐子大每服十五九至二 万樵篩蜜和凡如桐子大酒服七丸加至十五九忌 合各 熬五 法親五命甘草及桔梗 两附子始年两一枳實 三枝 吴茱萸 出楊氏 治脾胃中冷水穀不化心腹膨胀 普南す fi †

草豆熟散 - 薑丸 氣進美飲食療一切冷物所傷並皆治之 右為末散研与每服二錢煨生薑木瓜湯調下 草豆鬼一两良薑一肉桂 出街生 · 莊菜猪肉生菜一方米飲下空心食前服 白豆熟皮陳桶皮 治脾胃寒腹中虚鳴泄瀉不止 ォ 養脾温胃去冷消痰大治心脾疼 卷二十二 · 皮粗丁香 居 南豆製去品 五

沙でロまれたとう 炒白术分甘草五為陳橘皮 一十九食後橘皮湯下妊娠婦人不宜服 **基汁** 炙 出聖 香或桂心小白豆熟一兩乾量五錢 分為細末麵糊為九如梧桐子大每服十五 治脾胃虚冷宿食不消食物無味四肢 五十一

在アログイコー 張氏健中丸 治脾胃虚弱胃犯風冷腹痛腸鳴泄瀉 丁香半夏九出醫す 去浑食前稍熱服 右件藥塩羅為散每服三錢以水一中蓋煎至六分 經云食畢而下謂之洞泄手足冷面色青白下部虚 右為未薑汁糊為九如小豆大每服四十九薑湯下 華 我半夏三两湯洗七 人参 丁香 水香 肉豆熟 陳皮分 治脾胃宿冷嘔吐痰水噫醋吞酸

又す 次之口事在自 右為細末醋糊丸如梧桐子大每服四五十九至百 冷中湍氣短常服寬中健脾養胃育真固氣大於 凡空心食前米飲吞下 健脾温胃去寒進食用 胡椒 洗七次炒木香的可整麵裏 附子 厚朴整神麵 鄉吴茱萸 煨錢

金万四月百言 味厚朴凡 思飲食及飲食不消服之開胃進食 服得其宜後方平而和脾氣稍實者用之為穩 食前服亦名健中九前方藥性燥而烈脾氣虚寒者 右為細末煮棗肉凡如梧桐子大每服五十凡薑湯 二两去租皮生 薑汁 炙今紫 治脾胃虚冷氣上攻胸膈三焦不調不 是 挂与一方作桂枝附子去皮一两挂去租皮取内一附子一两 卷二十三 陳橘皮 — (र्वेज़ 白 湯 焙

钦定四車全書 图 空心晚食前温酒或鹽湯下嚼如大段膈氣進食不 得即留一半散每服二錢酒二合同煎至二合和滓 下九藥三十粒一方醋糊為九名燒胃丸 石為細末抖匀煉塞為九如梧桐子大每服三十 皮訶黎勒二兩 桂心 治脾胃氣虚冷水穀不化食即腹脹胸膈不利 治脾胃虚冷力見本門脾 三两去粗皮塗生陳橘皮 **蓬汁炎今香熟** 普泽方 胃壓冷類 两乾 二两 兩炮 粮焙草豆熟 湯浸

京三稜九 治脾虚宿食不消寬利胸膈消化飲食 每服七九至十九食後臨卧熟生薑湯下 右摄羅五味為末用三味膏和搗千杆丸如豌豆大 右件藥捣羅為未煉塞和搗一二百杆丸如梧桐子 大食前以粥飲下三十月 桂谷五钱去粗

次での手ととう 大温胖湯 時苦下痢 :水草果飲法 加熱水調和隨意服之 右吹咀每服五錢水一盞半煎至一盞去浑磁器感 番茶 烏梅肉丽草果 治脾胃中冷不得食水穀不消腹響脹滿 附子各地甘草 五十四

ないだんなる 右粗搗篩每服三錢水一盞入生薑五片煎至七 不得食面色瘘黄 右切以水八升煮取二升八合分為三服亦可四服 云浑空心温服 兩 注不下須臾復服甚良忌猪肉海藻松菜 治脾胃虚冷嘔逆醋心冷辟翻胃中淌酒 薑汁炙 两去粗 皮 一点白ボ 卷二十二 洗去滑 二兩五錢 炒 去白桂 炙 Ξ 皮

次定马车全等 题 雞舌香散 白豆熟丸 利水榖不消脹滿腸鳴 以米飲鹽湯下空心食前服 **右為細末酒煮麵糊為九如梧桐子大每服二十** 好詞恭勒皮 界七 大焙 · 桂 去 白豆乾 木香 乾薑吃枳實多一兩去半夏 滑 治脾胃虚冷胸風不寬吐逆霍亂臉腑不 治男子女人陰陽不和臟腑虚弱中 普済方 相白术 細辛去 黃書歸 五十五

養脾九出な ログロアとう 脱氣滞宿寒留飲停積不消胸膈脹滿心脾引痛攻 虚胀嘔逆惡心噫氣 吞酸泄瀉腸鳴水穀不化肢體 石為細未每服二錢入鹽少許用沸湯點服不拘時候 心噫氣吞酸並皆治之 刺腹肠有好飲食又治中酒吐酒停飲浸浸嘔逆惡 香附子炒去赤芍藥 天台 炒方桂各四两甘草五錢 治脾胃虚冷心腹絞痛胸膈痞悶脇肋 烏藥士良董 刑 蘆

七東湯出衛生 湯下食前服此藥養胃進食 急後重腸中虚鳴水榖不消不下飲食 右為末煉蜜和九每服一兩每兩作十九細嚼生薑 怠惰不思飲食 大麥蘇炒白茯苓去人參去蘆多乾薑吃縮砂仁 二斤 白术 升甘草 到棚一 治脾胃虚冷臍腹疼痛吐瀉不定裏

蛤蚧散 金牙四月在十二 乾薑 煎至七分去滓空心温服一方用生薑五片同煎去 右為細末每服一錢好溫酒調空心服 右剉如麻豆大每服二錢水一盞入棗七枚摩開同 川山甲等 子少益智去稿砂各四两甘草三 直炎乳香 木香 白茯苓 治脾胃氣攻心痛者 洒 茴香

飲之日華全書 國 木香枳實丸 治心氣脹湍食不消化 丹砂丸博游方 大每服三九至五九用水半盏煮一服取出臨卧酒 年不瘥及一切塊積 下至晚但微瀉一二行是驗並不瘦損人臟腑 右將六味細研以巴豆和与入白麵滴水丸如菜豆 开 巴司 二十起去皮心膜出 硇砂 麝香分 雄黄 油用醋半蓋麸成膏 治宿食不消及治厭食過身黃腫多 普濟方 銀丹 錢 · 順粉

右除麝香外搗為細末入麝香拌勻以水浸炊餅心 和凡小豆大每服七丸至十丸嚼破温热水下食後服 右為細未煉蜜丸如桐子大每服三十九空心温水下 麝香五分丁香皮到木香 监胃去甘松 根主達我院各二两 木香五枳實 三两去 英校本 三两去 可黎勒皮 地人参少大黄 三两都李仁 二 治脾胃不和胸膈痞悶飲食運化 巻ニャニ 兩

一般神九 治脾胃虚冷氣久不順中脫痞問全不思食 次で記事ととう一 木香餅子刺す 捻作餅每服三五餅細嚼生薑湯下温酒亦可不拘時 急少力不思飲食常服寬胸膈散滞氣消痰美飲食 淡舌溢心腹撮痛嘔逆宿水脇下疼悶喘湍氣急佬 右為細末别用甘草熬膏為九每兩作二百五十九 木香 五 舜 縮砂仁一兩檀香兩甘松流而丁香四蓬我茂 治脾經虚冷胃脘寒疾胸膈噎落口 普濟方

附子温中九 治脾胃順氣化痰嘔吐噎膈留飲腸鳴 食冷泄注辟寒養正氣 右為末煉塞九如桐子大每服三十九食後米飲下 右為細末煉塞為九一兩作十九每服一丸細嚼牛 停痰嘔逆水榖不化 附子 董治松實各五錢去 炒馬梅一 乾薑 白木西一肉桂 甘草谷五良董 兩陳橘皮去 白 生

アンドコキーという 一回 豆熟湯 煎至八分去滓熱服空心食前 董橘皮湯下米飲亦可食前 右六味搗羅五味為末入栗米未拌勻再羅過每服 不調及因冷物傷脾吐瀉不止 三錢七淘米清泔一盞半生薑三片聚五枚學破同 草四两高良薑四陳栗米二两炒 草豆熟并短用二两 桂皮 原橘皮四两湯甘 治脾胃虚冷水穀不化腹內疗刺撮痛脏腑 普湾方 五 十 九

磨脾丸 治三焦氣不升降脾臟衰弱胃氣虛湍不思 磨滞九 治脾胃氣不和宿食不消食已腹痛嘔喘惡 菜豆大每服三丸加至五九早晚食後臨寢服大便 **溏痢即減丸數** 方 擔羅四味為末與硇砂已且霜拌多醋煮 麵糊九 心胸膈痞悶大便秋利不定 木香 青橘皮湯浸去桂各一两吳茱萸三两 炒巴豆霜炒五面砂酯熬成 卷二十三 醋熬成霜研 轧湯

次をコキとよう 右為末水煮麵糊九小豆大每服二十九温米飲下 化水榖 耗氣可以剖判清濁交通上下使脾氣和實而能磨 減耗肌肉瘦痒面目痿黃寒濕結瘀飲氣下流漬傷 飲食舊穀未消新穀又入脾胃氣弱不能磨化穀氣 肝腎足脛虚浮怠惰嗜即四肢不收此藥服之並不 補骨胎六两炒京三核一斤大者地 两有那四大香四里三一斤湯洗去皮焙車炒六有那四大香四里三一斤湯洗去皮焙車炒 普濟方 細羅華澄站

茴香理中丸 治中焦不和脾胃宿冷心下虚痞肠中 健脾散 治脾胃虚冷水殼遲化不能飲食 色ラロアバーで 思食霍亂吐痢腸鳴不歇手足不和米穀運化 疼痛嘔吐冷痰飲食不下噫氣吞酸怠惰嗜卧全不 **右為末每服二錢七入鹽沸湯點服不拘時候** 不計時候 人参 白茯苓皮 黃者出來蘇炒黃 甘草

次記日奉全書 日 新法半夏湯出か 中酒吐酒噦逆惡心頭痛煩渴倦怠嗜卧不思飲食 停積不消心腹刺痛肠肋膨脹嘔吐痰水噫氣吞酸 右為細末煉塞為丸每兩分作十九食前用白湯化 不止及新產內虛皆可服亦温脾胃消痞滿留飲順 下嚼服亦可或丸如桐子大服亦可大病新産吐唾 二焦飲食辟風寒邪氣 八麥盖克薑此甘草西半尚香 二两一 治脾胃不和中脫氣滞宿寒留飲 普准方 二兩一方

大應丸 疾開胃健脾消酒進食 古為細末 麵糊九如菜豆大每服七九食後臨卧 右為細末每服一錢鹽湯點服不拘時常服温中破 史各五錢湯 大黄 本熟五靈脂炒青橘巴豆十五粒去皮浆水大黄 蒸熟五靈脂炒青橘 地雨丁香皮 木香 白茯苓各七錢甘草五分陳皮白神麴四两草果煨七半夏麴各二两草 治脾胃虚寒宿食不消壮熱憎寒頭目重痛 焙

東肉九出醫す 大小刀車 A. 好你好此就厚朴祖皮華美人參 陳橘皮半夏為末生薑汁厚朴各二两去人参 陳橘皮 半夏飲 治脾胃虚弱不能飲食乾熾惡心水穀不化 右為細未燈心煮聚內九如桐子大每服七十九董 食不化 湯鹽湯下 破故紙四两木香 見大 南豆蔻 裏根 治脾胃虚寒腹鳴泄瀉胸膈不快飲

木香丸 治脾胃虚寒宿食不消留滞成塊心腹疼痛 在少四人人 古為 細末醋煮麵糊和丸如豌豆大每服二丸至三 破同煎至八分去滓温服 右粗捣篩每服三錢七水一盞生薑五片棗二枚摩 凡食後臨卧生薑橘皮湯下 木香 丹砂谷三蓬我茂州京三稜各一两巴豆 ; 善 白术 每 粒去皮 油 のでは、100mのアプランと、「これには、100mの対象を対象に対象を対象に関することが、100mの対象を対象に対象に対象に対象に対象に対象を表示している。

阿魏丸 飲定四車全書 | E 丁香丸 治脾胃虚寒宿食不消两脇淌痛 糊丸如菜豆大每服五九至七九食後温生薑湯下 右研令勻酒煮麵糊丸如梧桐子大每服二十 九温 石搗羅四味為末入巴豆霜拌勻再羅用好酒者麵 去皮尖雙 仁生研 治脾胃虚寒宿食不消腹脹腹鳴通和五臓 研 戰稍炒麝香各一個砂半分桃仁四 丁香皮 乾薑地陳橘皮各一兩湯巴豆霜五 普濟方 六十<u>二</u>

温白丸 ありに 人 だって 附九出楊氏 煎生薑湯下食前空心服如腹痛嘔逆食後服 右為末生薑汁煮麵糊九如梧桐子大每服十九濃 酒下不嚼早辰日中臨卧各一 右為末蜜九每服十五丸細嚼橘皮湯下 半夏二两湯浸切作白木分丁香 了香雨附子吃豆熟 題裏胡椒 治脾胃虚冷一切病 治脾胃受寒虚冷者嘔吐不止 服 鐵各

次での事とと 半夏湯 破同煎至七分去滓温服不拘時候 水下食前 香乾薑枳木內 **石粗捣篩每服二錢七水一盞生薑三片棗一枚擘** 石為細末荷葉 燒飯丸如桐子大每服三五十九温 半夏白醬水白扁豆兩一人參 不香 美記董 五 然實力 治脾胃虚冷飲食不化嘔逆多痰 私蔵す 出 關室 普瀬オ 一兩白木 枳殼各五錢 五錢 氣消寒進飲 兩 7.

胡椒丸一名乾 玄胡九生堂 中疼痛或飲食過多胸肠逆湍噻噎不通咳嗽無時 冷吐冷痰婦人血氣肚腹疼痛癥瘕氣結蟲煩不安 空心食前米飲下 右為末麵糊丸如梧桐子大每服十五丸至二十九 玄胡 胡椒而烏頭吃製去乾薑吃赤石脂錢五 當歸 理中焦不和脾胃積冷心下虚痞腸腹 治脾胃虚冷大肠泄瀉飲食不化 青皮 蓬术 卷二十三 檳榔

次主日中主任 小三稜煎丸 末醋煮麵糊丸如桐子大每服三丸至五丸生薑湯 不拘時 右為末水粉為丸如桐子大每服三十九生薑湯下 取出前二味杵碎仍用餘醋炒光花微焦並焙乾為 右同入磁瓶內用米醋五升浸淌封瓶口慢火煨乾 京三稜 香香一三稜二 蓬莪茂春四光花雨 治宿食不消心腹脹湍吐逆吞酸 善涵方

治脾胃冷弱腹中積冷脹滿刺痛財後 治食生冷雜物或寒時衣薄當風或夜食便卧不即消 在ワロカとこ 厚朴湯 右以肥狗肉半斤米鹽豉等煮熟頓喫一兩頓愈 心腹煩痛脹急連日不化方 右粗搗篩每服五錢七水一盞半煎至八分去滓温服 下婦人醋湯下一才橘皮湯下 厚朴去粗皮塗生薑人参 治脾胃虚冷氣逆嘔吐不能下食 陳橘皮。 去白炒

欠已四年亡的 图 石焼地令極熱即敷薄薦若莞席向卧覆取汗即 語濟方 六

金人正是白星 哲濟方卷二十三 卷二十三